

स्तन क्यान्सर

स्तन क्यान्सर विकसित मूलकको महिलाहरूमा सबैभन्दा बढी लाग्ने क्यान्सर हो। पारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगाउन नै यस क्यान्सरसँग लड्न सक्ने र जीवित रहने मुख्य आधार हो। कतिपय कम वा मध्यम आय मूलकहरूमा अहिले दोब्बर बोझ, स्तन क्यान्सर र गर्भशय क्यान्सरको सामना गर्नु परिरहेको छ। ३० वर्ष माथिका महिलारूमा यी दुई क्यान्सर सबैभन्दा ज्यानलिने क्यान्सरमा पर्दछ।

१) कस्ता महिलाहरू जोखिममा छन् ?

- १ उमेर बढ्दै जादाँ खतरा पनि बढ्छ
- २ कम उमेरमा महिनावारी शुरु भएमा (१२ वर्ष भन्दा अघि)
- ३ ढिलो महिनावारी रोकिएमा (५५ वर्ष भन्दा पछि)
- ४ बढी उमेरमा बच्चा जन्माएमा वा कहिल्यै पनि बच्चा जन्म नदिएमा
- ५ पहिला एक स्तनमा क्यान्सर वा कुनै गिर्खा भएमा
- ६ परिवारमा कसैको स्तन क्यान्सर भएमा जस्तै आमा वा दिदी बहिनीहरू
- ७ बातावरण र डायटरी योजना

२) लक्षणहरू र चिन्हहरू

- १ स्तनमा डिम्पल वा खाल्डो जस्तो भएमा
- २ स्तनको साइज वा आकार परिवर्तन भएमा
- ३ स्तनमा कुनै गिर्खा भएमा
- ४ काखीमुनी गिर्खा वा कुनै सुन्निएको जस्तो
- ५ स्तनको मुन्टा भित्र पसेमा, त्यसबाट रगत वा केही डिस्चार्ज आएमा

३) रोकथाम

विभिन्न तरिकाले स्तन क्यान्सरको खतरा कम गर्न मद्दत गर्दछ।
क्यान्सर रोकथामको लागि सिफारिस

- १ स्वास्थ्य वजन राख्ने
- २ हरेक दिन कम्तिमा ३० मिनेट व्यायम गर्ने
- ३ गुलियो पेय पर्दाथ कम पिउने धेरै परिकारको सागसब्जी, फलफूल, अन्न र गोडागुडी खाने
- ४ रातो मासु कम खाने -जस्तै गाईको मासु, सुँगुरको मासु, खशीको मासु र सादेको मासु
- ५ यदि रक्ती पीउनु हुन्छ भने, पुरुषहरूले २ युनिट मात्र र महिलाहरूले १ युनिट मात्र
- ६ नुनिलो र सादेको खाना कम खाने
- ७ क्यान्सरबाट बच्नको लागि वजारिय खुराक – (supplement) प्रयोग गर्नुहोला

५) स्कीनिङ

स्तन क्यान्सर स्कीनिङको लागि तीन मुख्य जाँचहरू

- क) मेम्मोग्राम
- ख) क्लिनिकल स्तन जाँच
- ग) स्वयंम स्तन जाँच

- १ स्तन स्कीनिङ भनेको महिलाले आफ्नो स्तन मा कुनै लक्षण हुनु भन्दा आफैले पत्ता लगाउने हो
- २ तपाई आफ्नो चिकित्सकसँग कुन टेष्ट तपाईको लागि सही भनेर सोध्नुहोस्


६) विशेष जनसंख्याको लागि सिफारिस

- १ आमाहरूको लागि नवजात शिशुलाई कम्तिमा ६ महिनासम्म दूध खुलाउने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अरु तरल पर्दाथ र खाना दिने
- २ क्यान्सर उपचार पछि, बच्चाहरूले क्यान्सर निवारण सिफारिस पालना गर्नु पर्छ

कस्ता महिलाहरू बढी जोखिममा छन्

- १ परिवारमा कसैको स्तन क्यान्सर भएमा। जस्तै आमा, दिदी बहिनीहरू
- २ जो महिलाको पहिला एक स्तनमा क्यान्सर भएमा

Abnormal breast signs



४) पारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगाउने

छिटो पत्ता लगाउने दुई तरिकाहरू

- १ पारम्भिक निदान या पारम्भिक लक्षण र चिन्ह भएका महिलाहरूको शुरुमा नै निदान र छिटो उपचार गर्न सकिन्छ
- २ कुनै पनि लक्षण नभएका महिलाहरूमा स्कीनिङ टेस्ट जसको उद्देश्य कुनै असामान्यता जो क्यान्सर जस्तो लक्षण पत्ता लगाउन

Self-breast Examination



Screening Mammography

