

गर्भनली को क्यान्सर : स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र अण्डशय क्यान्सर पछि, गर्भनली (पाठेघरको मुखको) क्यान्सर हङ्कङ्कका महिलाहरुमा पाइने सर्वाधिक क्यान्सर हो ।

## गर्भनलीको क्यान्सर कसलाई हुन सक्छ

- हुमेन पैपीलोमा भाइरस (HPV) द्वारा संक्रमण भएकालाई ।
- कम उमेरदेखि यौन सम्पर्क शुरु गर्नेहरु ।
- धेरै व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्नुले
- धूम्रपान गर्नाले ।
- शरीरमा कीटाणुहरु सँग लड्ने शक्ति कम हुनाले ।



## सुरक्षित रहने तरिकाहरु


- यौन सम्पर्क गर्दा नियमित कन्डोमको प्रयोग गर्ने (सुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने)
- एक जना व्यक्तिसँग मात्र यौन सम्पर्क राख्ने ।
- धूम्रपान निशेध गर्ने ।
- स्वस्थ जीवन शैली अपनाउने ।



### Safe Sex. No Regrets.

## सर्भाइकल स्क्रीनिंग (गर्भनली, पाठेघरको मुख) क्यान्सरको जाँच

- सर्भाइकल स्मीअर, योनीबाट गरीने एक सरल जाँच हो जसबाट गर्भनलीको कोषमा भएको असामान्य परिवर्तन पत्ता लगाईन्छ ।
- यो जाँच छिटो, कम पीडा, सामान्यतया सस्तो र सुविधाजनक सुलभ छ ।
- प्रारम्भिक असामान्य परिवर्तन पत्ता लगाएर, सुरुमानै उपचार गरी गर्भनलीको क्यान्सर बढ्नुबाट बचाउन सकिन्छ र सर्वोत्तम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।



## प्याप स्मीयर जाँच कसले र कति अन्तरालमा गर्नु पर्छ ?

- २५ देखि ६४ वर्ष सम्म का यौन सम्पर्क गरिसकेका सबै महिलाहरुले ।
- महिलाहरुले प्याप स्मीअर जाँच २ वर्ष सम्म हरेक वर्ष नियमित गर्नु पर्छ । यदि पहिलो २ वर्ष को दुबै जाँचको परिणाम सामान्य निस्कियो भने त्यसपछि हरेक ३ वर्षको अन्तरालमा जाँच गर्नु पर्छ ।



सर्भाइकल स्मीअर जाँचका लागि आफ्नो पारिवारिक चिकित्सक, स्त्री रोगका विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक, गैर सरकारी संघ, अथवा मातृ तथा स्वास्थ्य विभागको बाल स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।

केही महिलाहरुले एच पी भी (HPV) खोप प्राप्त गर्नु भएको होला तर आफ्नो सम्पूर्ण सुरक्षाको लागि नियमित सर्भाइकल स्मीअर जाँच गर्नुपर्छ ।

